

資料

鈴木裕寄生蜂コレクション標本目録

A List of Parasitoid Wasp Specimens of Y. Suzuki Collection.

渡辺恭平¹⁾・駒形 森²⁾・鈴木 裕³⁾Kyohei WATANABE¹⁾, Shin KOMAGATA²⁾ & Yutaka SUZUKI³⁾**Key words:** fauna, hymenoptera, Kanagawa, Miura peninsula, new records.

はじめに

筆者の一人、鈴木は、主に三浦半島をフィールドに、カメムシやハナアブを中心とした昆虫の調査を進めてきた。その際、若干の寄生蜂類についても採集と標本作成を行っており、それらが一定の量に達したため、寄生蜂コレクションとして、全ての標本について神奈川県立生命の星・地球博物館に寄贈を行った。その後、渡辺が含まれていた337個体全ての標本を同定し、資料番号を印刷したラベルをつけて駒形がデータの入力を行い、それらデータについて鈴木が確認と補足をし、整理が完了した。寄生蜂は同定の難しさから各地における分布記録は乏しく、本寄贈標本の中にも分布記録として重要なものが多数見いだされた。そこで、本コレクションに含まれる標本のデータについて、目録として記録を報告することにした。

凡例

各標本のデータは頭数（雌雄が判明している場合、メスはF、オスはMと表記）、KPM-

NK ではじまる生命の星・地球博物館の資料番号、採集地名、8ケタの数字による採集年月日(YYYYMMDD)、採集者名で示した。

目録

Ichneumonidae ヒメバチ科

Acaenitinae ケンオナガヒメバチ亜科

Arotes moiwanus (Matsumura, 1912) モイワケンヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001947, 山梨県甲州市上萩原, 20130720, 鈴木裕採集.

ブナの立ち枯れや倒木によく飛来する。

Coleocentrus exareolatus Kriechbaumer, 1894

1 F, KPM-NK 5001943, 長野県大町市, 20020525, 山本光人採集.

Ito & Maeto (2015a) により日本から記録された種で、前翅に鏡胞を欠くことで他種から容易に区別できる。国内では北海道、福島県、群馬県、山梨県、東京都、奈良県、鹿児島県より記録がある。長野県初記録である。

Coleocentrus incertus (Ashmead, 1906)

コンボウケンヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001941, 神奈川県丹沢 大股沢, 19990610, 鈴木裕採集; 1 F, KPM-NK 5001942, 神奈川県山北町大野山, 19990617, 鈴木裕採集.

広葉樹、針葉樹問わず枯れ木に飛来する普通種。

Jezarotes tamanukii Uchida, 1928 タマヌキケンヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001944, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20020602, 鈴木裕採集; 1 F, KPM-NK 5001945, 神奈川県三浦市北川, 20070630, 鈴木裕採集.

コナラの立ち枯れによく飛来する。*Jezarotes* 属は従来、後脚腿節が黒色のものをタマヌキケンヒメバチ、黄色のものをヤマトケンヒメバチ *J. yamatonis* としていたが、Ito & Maeto

¹⁾ 神奈川県立生命の星・地球博物館
〒250-0031 神奈川県小田原市入生田 449
Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
499 Iryuda, Odawara, Kanagawa 250-0031, Japan
渡辺: watanabe-k@nh.kanagawa-museum.jp

²⁾ 東京農業大学昆虫学研究室
〒243-0034 神奈川県厚木市船子 1737
Laboratory of Entomology, Tokyo University of Agriculture
1737 Funako, Atsugi, Kanagawa 243-0034, Japan.

³⁾ 三浦半島昆虫研究会
〒237-0068 神奈川県横須賀市追浜本町 1-11
Miura Peninsula Insect Study Club
1-11 Oppamahoncho, Yokosuka, Kanagawa 237-0068,
Japan.

(2015b)により DNA の塩基配列が比較され、ヤマトケンヒメバチはタマヌキケンヒメバチのシノニムとされた。神奈川県から得られている個体はいずれも後脚腿節が黒色のもので、色彩には地域的な傾向が存在するかもしれない。

Spilopteron apicale (Matsumura, 1912) ツマグロケンヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001946, 長野県青木村田沢, 20070819, 鈴木裕 採集.

Anomaloninae コンボウアメバチ亜科

Anomalon nigribase Cushman, 1937

クロアミメコンボウアメバチ

1 F & 1 M, KPM-NK 5002019 ~ 5002020, 岐阜県岐阜市水道山, 20020622, 山本光人採集; 1 M, KPM-NK 5002021, 神奈川県横須賀市猿島, 20020621, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002018, 神奈川県逗子市披露山公園, 20070706, 鈴木裕 採集.

Anomalon coreanum (Uchida, 1928) アミメコンボウアメバチ

1 M, KPM-NK 5002022, 神奈川県藤沢市大庭, 19890614, 鈴木裕 採集.

神奈川県初記録である。

Aphanistes sp.

1 M, KPM-NK 5002034, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010601, 鈴木裕 採集.

Erigorgus garugawensis (Uchida, 1928)

ガルガワコンボウアメバチ

1 ex., KPM-NK 5002041, 千葉県丸山町, 19970601, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002039, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20010404, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002036, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002037, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20020414, 鈴木裕 採集; 2 F, KPM-NK 5002035, 5002040, 神奈川県葉山町仙元山, 20020418, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002038, 神奈川県葉山町南郷公園, 20030410, 鈴木裕 採集.

三浦半島には多いが、他の県内各地域ではあまり見られない。成虫は春から初夏にかけて出現し、照葉樹林の林内や林縁を飛翔する。神奈川県初記録である。

Habronyx insidiator (Smith, 1874) コンボウアメバチ

1 M, KPM-NK 5002024, 19640426, 神奈川県横須賀市追浜本町, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002023, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20020514, 鈴木裕 採集.

ヤマユガ科のガに寄生するが、ガの減少に伴い各地で減少しており、県レッドデータブックでは絶滅危惧 II 類に区分されている (長瀬, 2006)。

Heteropelma amictum (Fabricius, 1775)

カラフトコンボウアメバチ

1 M, KPM-NK 5002031, 神奈川県葉山町上山口, 19641004, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002029, 神奈川県横浜市緑区三保, 19930703, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002025, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20081007, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002028, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20091021, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002030, 山梨県富士吉田市杓子山,

20120630, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002026, 神奈川県横須賀市野比5丁目, 20121105, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002027, 神奈川県葉山町上山口, 20131006, 鈴木裕 採集.

葉山町上山口で得られた1964年と2013年採集の標本(KPM-NK 5002031, 5002027)は当地における本種の継続した生息の証拠として貴重である。

Heteropelma sp.

1 M, KPM-NK 5002032, 神奈川県葉山町三ヶ岡公園, 19970905, 鈴木裕 採集.

Therion circumflexum (Linnaeus, 1758)

マツヤドリコンボウアメバチ

1 M, KPM-NK 5002033, 山梨県富士吉田市杓子山, 20120630, 鈴木裕 採集.

Banchinae ウスマルヒメバチ亜科

Alloplasta longipetiolaris (Uchida, 1952)

クロウスマルヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001921, 神奈川県逗子市桜山, 20000404, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001920, 神奈川県横須賀市長坂沢山池, 20130422, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001919, 神奈川県横須賀市砲台山, 20130425, 鈴木裕 採集.

Exetastes atrator (Forster, 1771) ヨトウウスマルヒメバチ

1 M., KPM-NK 5001923, 神奈川県三浦市城ヶ島, 20020416, 鈴木裕 採集; 1F1M, KPM-NK 5001924 ~ 5001925, 神奈川県葉山町仙元山, 20020418, 鈴木裕 採集.

Exetastes fornicator miniatus Uchida, 1928 アカアシウスマルヒメバチ

1 F., KPM-NK 5001922, 山梨県南都留郡三ツ峠山, 19970902, 鈴木裕 採集.

Exetastes ishikawensis Uchida, 1928

イシカワウスマルヒメバチ

1 M., KPM-NK 5001927, 神奈川県横浜市川上町, 19950528, 鈴木裕 採集; 1 M., KPM-NK 5001929, 神奈川県横須賀市武山, 19960519, 鈴木裕 採集; 1 F., KPM-NK 5001926, 神奈川県横須賀市津久井 鬼ヶ谷戸, 20090927, 鈴木裕 採集; 1 F., KPM-NK 5001928, 神奈川県横須賀市鷹取山, 採集日不明, 鈴木裕 採集.

KPM-NK 5001928 の個体は種名不明のガの繭から羽化した個体である。本種の寄主は未知であるため、今後の再調査が望まれる。

Teleutea minamikawai Momoi, 1963

ミナミカワナガハマキヤドリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001918, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20020712, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001917, 神奈川県横須賀市汐入町諏訪公園, 20120829, 鈴木裕 採集.

Campopleginae チビアメバチ亜科

Campoplex tosenensis (Uchida, 1932) トサチビアメバチ

1 F, KPM-NK 5002042, 神奈川県横須賀市野比5丁目, 20121105, 鈴木裕 採集.

神奈川県初記録である。

チビアメバチ亜科の未同定種

1 ex., KPM-NK 5002056, 静岡県御殿場市神山, 19900514, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002043, 神奈川県横須賀市観音崎, 20010409, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002044, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002045, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010601, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002057, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20020423, 鈴木裕 採集; 2 exs., KPM-NK 5002049 ~ 5002050, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20020414, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002046, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20030419, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002047, 神奈川県横須賀市大楠山, 20040614, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002054, 採集地不明, 20041003, 採集者不明; 1 ex., KPM-NK 5002051, 神奈川県横須賀市衣笠城址, 20070519, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002058, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20090423, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002048, 千葉県栄町安食, 20100528, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002053, 神奈川県横須賀市追浜本町一丁目, 20120607, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002052, 山梨県富士吉田市杓子山, 20120630, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002055, 神奈川県横須賀市長坂・沢山池, 20130422, 鈴木裕 採集.

Cryptinae トガリヒメバチ亜科

Acroricnus ambulator ambulator (Smith, 1874)

キアシオナガトガリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001899, 神奈川県横須賀市衣笠山公園, 20060929, 鈴木裕 採集.

Agrothereutes lanceolatus (Walker, 1874)

シロテントガリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001903, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20030503, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001902, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20080507, 鈴木裕 採集.

Arthula flavofasciata (Uchida, 1931)

キマダラアシナガバチヤドリトガリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001891, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20010501, 鈴木裕 採集.

キボシアシナガバチに寄生するが、寄生を受けた幼虫がいる巣を採集する以外では、ほとんど採集されない。神奈川県初記録である。

Gotra octocincta (Ashmead, 1906)

キマダラコシホソトガリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001900, 神奈川県逗子市神武寺, 20070724, 鈴木裕 採集.

神奈川県初記録である。

Myrmeleonostenus babai Uchida, 1936

アリジゴクヤドリトガリヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001890, 神奈川県横須賀市猿島, 20020621, 鈴木裕 採集.

Nematopodius (Nematopodius) oblongus Momoi, 1967

マダラホソトガリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001892, 沖縄県名護市, 20020330, 鈴木裕 採集 (材より羽化).

本種は国内では千島列島、北海道、本州、九州から記録があるが、本個体は南西諸島初記録となる。

Picardiella tarsalis (Matsumura, 1912)

ココロオナガトガリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001901, 神奈川県鎌倉市七里ヶ浜二丁目, 20080821, 鈴木裕 採集.

Pterocryptus uchidai (Momoi, 1963)

アシプトクロトガリヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001895, 神奈川県横浜市円海山, 19680922, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001897, 神奈川県横須賀市武山, 19960519, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001894, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20000602, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001893, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010825, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001896, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20090423, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001898, 神奈川県逗子市桜山大山林道, 20110505, 鈴木裕 採集.

森林内の枯れ木に多い。寄主としてはスギノアカネトラカミキリが知られる (Momoi, 1963) が、上記産地ではスギノアカネトラカミキリは見られず、近縁種のトガリアカネトラカミキリが多いため、それらが寄主となっている可能性が高い。

Uchidella okamotoi (Uchida, 1936)

1 M, KPM-NK 5001904, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20020423, 鈴木裕 採集.

トガリヒメバチ亜科の未同定種

1 M, KPM-NK 5001908, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 19970429, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001906, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010426, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001907, 神奈川県葉山町長柄大山, 20010505, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001913, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001910, 神奈川県横須賀市秋谷子安, 20010526, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001912, 福島県南会津郡小林・日宮沢, 20010728, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001911, 神奈川県横浜市上郷町, 20020415, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001909, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20020330, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001914, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20021029, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001905, 神奈川県横須賀市津久井, 20021118, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001915, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20090923, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001916, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20090923, 鈴木裕 採集.

Ctenopelmatinae マルヒメバチ亜科

Hadrodactylus orientalis Uchida, 1930

トウヨウマルヒメバチ

4 exs., KPM-NK 5002060 ~ 5002063, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20090423, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002059, 神奈川県横須賀市浦郷町, 20130502, 鈴木裕 採集.

Opheltes glaucopterus apicalis (Matsumura, 1912)

ベッコウアメバチモドキ

1 M, KPM-NK 5002078, 山梨県甲州市上萩原, 20130720, 鈴木裕 採集.

Sympherta sp.

1 F, KPM-NK 5002065, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20010427 鈴木裕 採集

Trematopygus ruficornis (Zetterstedt, 1838)

キョウトマルヒメバチ

1 F, KPM-NK 5002064, 神奈川県横須賀市野比5丁目, 20130408, 鈴木裕 採集;

マルヒメバチ亜科の未同定種

1 ex., KPM-NK 5002069, 神奈川県横須賀市観音崎, 20010409, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002072, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010426, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002066, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20010429, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002073, 5002077, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20010504, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002074, 神奈川県逗子市披露山, 20010507, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002075, 神奈川県逗子市池子, 20010510, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002070, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002076, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010601, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002067, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010805, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002071, 神奈川県横浜市上郷町, 20020415, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002068, 神奈川県横須賀市長坂・沢山池, 20130422, 鈴木裕 採集.

Diplazontinae ヒラタアブヒメバチ亜科

Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781) ハラアカアブヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001937, 神奈川県横須賀市追浜本町, 19680916, 鈴木裕 採集.

Diplazon scutatorius Teunissen, 1943 ニセクロアブヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001936, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010426, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001935, 神奈川県逗子市池子, 20010510, 鈴木裕 採集.

Syrphoctonus tarsatorius (Panzer, 1809)

シロスジアブヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001933, 神奈川県横須賀市追浜本町, 20040419, 鈴木裕 採集.

Woldstedtius flavolineatus flavolineatus (Gravenhorst, 1829)

1 F, KPM-NK 5001934, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20030419, 鈴木裕 採集.

Eucerotinae フトマルヒメバチ亜科

Euceros pectinis Barron, 1978

1 F, KPM-NK 5001940, 神奈川県葉山町長柄 大山, 20110505, 鈴木裕 採集.

神奈川県初記録である。

Euceros sensibus Uchida, 1930 キモンフトマルヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001939, 神奈川県鎌倉市山崎 中央公園, 20090423, 鈴木裕 採集.

Ichneumoninae ヒメバチ亜科

Achais oratorius albizonellus (Matsumura, 1912)

シロスジヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001814, 神奈川県鎌倉市源氏山公園, 19940529, 鈴木裕 採集; 2 M, KPM-NK 5001810 ~ KPM-NK 5001811, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001812, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010825, 鈴木裕 採集; 2 M, KPM-NK 5001808 ~ KPM-NK 5001809, 神奈川県横須賀市猿島, 20020621, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001813, 神奈川県横須賀市追浜本町, 20040419, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001815, 神奈川県横浜市金沢区野島公園, 20080604, 鈴木裕 採集.

Amblyjoppa cognatoria (Smith, 1874) クロヒメバチ

1 ex., KPM-NK 5001828, 神奈川県秦野市大倉, 19680818, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001829, 神奈川県逗子市神武寺, 19690531, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001819, 神奈川県横須賀市貝山, 19800705, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001820, 神奈川県横須賀市貝山, 19801026, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001826, 神奈川県横須賀市武山, 19920517, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001822, 神奈川県横須賀市鷹取山, 19990614, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001825, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001821, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20010820, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001823, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20010824, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001824, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20030430, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001827, 神奈川県横須賀市野比, 20080827, 鈴木裕 採集.

Amblyjoppa forticornis maculifemorata (Matsumura, 1912)

アシマダラヒメバチ

1 ex., KPM-NK 5001830, 神奈川県横須賀市砲台山, 19971010, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001831, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20020911, 鈴木裕 採集.

Amblyjoppa proteus satanas (Kriechbaumer, 1895)

イヨヒメバチ

1 ex., KPM-NK 5001844, 神奈川県横須賀市佐島, 19661010, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001849, 神奈川県横須賀市貝山, 19800921, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001853, 神奈川県逗子市神武寺, 19930911, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001851, 神奈川県葉山町三ヶ岡公園, 19970405, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001845, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010602, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001847, 神奈川県横須賀市武山, 20010919, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001846, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 200208**, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001848, 神奈川県横須賀市浦郷町貝山緑地, 20090612, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001852, 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町, 20010808, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001850, 神奈川県横須賀市田浦町5丁目, 20120615, 鈴木裕 採集.

Callajoppa exaltatoria mikado (Cameron, 1886) ハキヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001805, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20090607, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001804, 神奈川県横須賀市津久井 鬼ヶ谷戸, 20121108, 鈴木裕 採集.

Cratichneumon bifasciatus (Uchida, 1926)

フタシロオビヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001816, 神奈川県横須賀市鷹取山, 19990525, 鈴木裕 採集; 2 M, KPM-NK 5001817 ~ 5001818, 神奈川県横須賀市猿島, 20020621, 鈴木裕 採集

Fileanta caterythra Townes, Momoi & Townes, 1965

ハラアカヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001857, 神奈川県横須賀市天神島, 20030909, 鈴木裕 採集.

Holcojoppa mactator (Tosquinet, 1889) アゲハヒメバチ

1 ex., KPM-NK 5001798, 神奈川県横須賀市猿島, 19870815, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001799, 神奈川県横須賀市武山, 19920517, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001800, 神奈川県葉山町南郷公園, 20030826, 鈴木裕 採集; 3 exs., KPM-NK 5001801 ~ 5001803, 葉山町長柄, 採集日不明, 柳本茂 採集.

KPM-NK 5001801 ~ 5001803 はいずれもキアゲハの蛹より羽化した個体である。

Ichneumon kuroishiensis (Uchida, 1929)

1 M, KPM-NK 5001854, 長野県塩尻市高ボッチ, 19960820, 鈴木裕 採集.

本種は青森県黒石で採集された標本をもとに記載された種であるが、その後は岩手県から記録があるのみであった。長野県初記録である。

Ichneumon molitorius Linnaeus, 1761 シロテンアカヤガヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001855, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20010427, 鈴木裕 採集.

Ichneumon nipponicus Uchida, 1926 キアシホソヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001859, 神奈川県横須賀市猿島, 20020621, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001858, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20120613, 名尾良英 採集.

各地に個体数が多い種であるが、複数種が含まれている可能性がある。また、メスは未知であり、おそらく体色が異なるものと思われる。

Ichneumon yumyum Kriechbaumer, 1895 マダラヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001840, 神奈川県横須賀市追浜, 鈴木裕 採集 19620802; 1 M, KPM-NK 5001842, 静岡県御殿場市, 19930617, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001841, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 鈴木裕 採集 20020831; 1 M, KPM-NK 5001843, 千葉県印旛村吉富 北印旛沼, 20100528, 鈴木裕 採集.

Naenaria segmentalia (Uchida, 1925) フシナガヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001835, 長野県塩尻市高ボッチ, 19960820, 鈴木裕 採集.

Oronotus ishiyamanus (Uchida, 1926) イシヤマチビヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001807, 神奈川県小田原市石垣山, 20020315, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001806, 神奈川県横須賀市津久井, 20021118, 鈴木裕 採集.

神奈川県初記録である。

Quandrus pepsoides (Smith, 1852) クロハラヒメバチ

2 exs., KPM-NK 5001792 ~ 5001793, 神奈川県葉山町三ヶ岡公園, 19970905, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001794, 神奈川県横須賀市追浜, 19901126, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001795, 神奈川県横須賀市野比, 20080827, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001796, 神奈川県横須賀市猿島, 19870815, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001797, 神奈川県横須賀市天神島, 20000704, 鈴木裕 採集.

Togea albofasciata Uchida, 1926 シロスジトゲヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001832, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010825, 鈴木裕 採集.

Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1820)

オオシラホシヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001856, 神奈川県横須賀市大楠山, 19680908, 鈴木裕 採集.

Vulgichneumon leucaniae (Uchida, 1924)

アワヨトウヤドリヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001833, 神奈川県葉山町長柄, 20030810, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001834, 神奈川県鎌倉市山崎中央公園, 20090423, 鈴木裕 採集.

Zanthojoppa speciosa (Uchida, 1926)

クロヒゲナガヒョウモンヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001839, 栃木県日光市中禅寺湖, 19680512, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001836, 神奈川県横須賀市長沢, 19940417, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001838, 神奈川県鎌倉市広町緑地, 20080731, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001837, 神奈川県葉山町南郷公園, 20090513, 鈴木裕 採集.

ヒメバチ亜科の未同定種

1 ex., KPM-NK 5001869, 神奈川県葉山町二子山, 19660109, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001860, 神奈川県三浦市引橋, 19790609, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001872, 神奈川県川崎市溝口, 19800313, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001861, 神奈川県横須賀市長井, 19940904, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001867, 神奈川県横須賀市鷹取山, 19970419, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001882, 山梨県南都留郡三ツ峠山, 19970902, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001881, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20000402, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001871, 神奈川県逗子市披露山, 20000404, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001879, 神奈川県横須賀市田浦大昨町, 20000428, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001874, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20010504, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001880, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010728, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001864, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010909, 鈴木裕 採集; 4 exs., KPM-NK 5001865 ~ 5001866, 5001873, 5001887, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20020414, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001885, 神奈川県三浦市城ヶ島, 20020416, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001886, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001875, 神奈川県横須賀市追浜本町, 20020520, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001884, 長野県大町市, 20020523, 山本光人 採集; 1 ex.,

KPM-NK 5001876, 神奈川県横須賀市猿島, 20020621, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001877, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20030824, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001863, 神奈川県横須賀市大楠山, 20040614, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001889, 神奈川県横須賀市天神島, 20040812, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001883, 静岡県富士市富士川, 20080317, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001888, 神奈川県横須賀市野比5丁目, 20080827, 鈴木 裕 採集; 2 exs., KPM-NK 5001868 ~ 5001870, 5001878, 神奈川県鎌倉市山崎 中央公園, 20090423, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001862, 長野県白馬村八方, 20100714, 鈴木 裕 採集.

Mesochorinae フタオヒメバチ亜科

Astiphromma dorsale (Holmgren, 1858) コブフタオヒメバチ
1 M, KPM-NK 5001930, 神奈川県葉山町南郷公園, 20090513, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001931, 神奈川県横須賀市長坂 沢山池, 20130422, 鈴木 裕 採集.
神奈川県初記録である.

Mesochorus sp.

1 M, KPM-NK 5001932, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20060421, 鈴木 裕 採集.

Metopiinae メンガタヒメバチ亜科

Colpotrochia (Colpotrochia) nipponensis Uchida, 1930

キマダラツヤアシプトヒメバチ

1 ex., KPM-NK 5001970, 長野県白馬村八方, 20120713, 鈴木 裕 採集

Hysicera nigribasis Momoi & Kusigemati, 1970

1 ex., KPM-NK 5001976, 神奈川県横須賀市小原台, 20080428, 鈴木 裕 採集

Metopius (Ceratopius) kiushiuensis Uchida, 1932

キュウシュウメンガタヒメバチ

1 ex., KPM-NK 5001971, 群馬県武尊山, 20120728, 柳本 茂 採集.

Metopius (Metopius) browni Ashmead, 1905

キオビメンガタヒメバチ

1 ex., KPM-NK 5001973, 神奈川県横須賀市貝山, 19790717, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001974, 神奈川県山北町大野山, 20060622, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001972, 沖縄県竹富町西表島高那, 20091014, 鈴木 裕 採集.

Ophioninae アメバチ亜科

Dictyonotus purpurascens (Smith, 1874)

ムラサキウスアメバチ

1 F, KPM-NK 5002079, 神奈川県葉山町南郷公園, 20030826, 鈴木 裕 採集.

Enicospilus javanus (Szépligeti, 1910)

1 F, KPM-NK 5002090, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010825, 鈴木 裕 採集.

Enicospilus maruyamanus (Uchida, 1928)

マルヤマホシアメバチ

1 M, KPM-NK 5002083, 神奈川県横浜市栄区小山台, 19930628, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002082, 神奈川県横須賀市めぐりの森, 20120922, 鈴木 裕 採集.

KPM-NK 5002083 はドウダントツジ上のガと思われる繭より羽化した個体である.

Enicospilus nigribasalis (Uchida, 1928)

モトグロホシアメバチ

1 F, KPM-NK 5002080, 神奈川県横須賀市衣笠山公園, 20070820, 鈴木 裕 採集.

Enicospilus nigropectus Cameron, 1905 クロホシアメバチ

1 F, KPM-NK 5002094, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20090607, 鈴木 裕 採集.

神奈川県初記録である.

Enicospilus shikokuensis (Uchida, 1928) シコクホシアメバチ

1 ex., KPM-NK 5002093, 神奈川県横須賀市武山, 19950603, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002092, 神奈川県横須賀市鷹取山, 19970419, 鈴木 裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002091, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木 裕 採集.

Enicospilus signativentris (Tosquinet, 1903)

タイワンミスジホシアメバチ

1 F, KPM-NK 5002089, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010825; 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002087, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20011219, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002088, 神奈川県葉山町南郷公園, 20020410, 鈴木 裕 採集.

馬堀自然教育園で得られた個体は12月に採集されており、注目すべき記録である.

Enicospilus spp.

1 F, KPM-NK 5002081, 神奈川県横須賀市津久井町伊勢林道, 19930819, 丸山清 採集; 1 ex., KPM-NK 5002086, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010825, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002084, 神奈川県横須賀市衣笠山公園, 20080901, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002085, 神奈川県横須賀市鷹取山, 201012**, 鈴木 裕 採集.

Ophion spp.

1 M, KPM-NK 5002097, 神奈川県横須賀市追浜, 19610416, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002095, 神奈川県逗子市久木大池, 20000626, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002096, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20030326, 鈴木 裕 採集.

Pimplinae ヒラタヒメバチ亜科

Acropimpla persimilis (Ashmead, 1906)

クロヒゲフシオナガヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001981, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20030715, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001982, 神奈川県葉山町上山口, 20030909, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001980, 神奈川県横須賀市, 20120607, 鈴木 裕 採集.

Apechthis capulifera (Kriechbaumer, 1887)

コキアシヒラタヒメバチ

1 M, KPM-NK 5001993, 長野県須坂市峰の原高原,

20070818, 鈴木 裕 採集.

Apechthis rufata (Gmelin, 1790) キフタホシヒラタヒメバチ
1 M, KPM-NK 5001987, 長野県須坂市峰の高原高原,
20070818, 鈴木 裕 採集.

Brachyapus nikkoensis (Uchida, 1928) ニッコウクモヒメバチ
2 F, KPM-NK 5001991 ~ 5001992 神奈川県横須賀市鷹取山,
19571012, 鈴木 裕 採集.

Dolichomitus melanomerus macropunctatus (Uchida, 1928)
クロコブフシヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001978, 静岡県御殿場市大阪, 19910904, 平
賀 誠 採集; 1 F, KPM-NK 5001977, 神奈川県逗子市池子,
20010525, 鈴木 裕 採集.

Gregopimpla himalayensis (Cameron, 1899)
サクサンフシヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001983, 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町,
20000630, 橋本 修 採集.

Itopectis alternans epinotiae Uchida, 1928
マツケムシヒラタヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001994, 神奈川県三浦市城ヶ島, 20020416,
鈴木 裕 採集.

Paraperithous chui (Uchida, 1934) チュウフシオナガヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001979, 神奈川県横須賀市野比5丁目,
20130923, 鈴木 裕 採集.

Pimpla alboannulata Uchida, 1928 シロモンヒラタヒメバチ
1 M, KPM-NK 5002003, 神奈川県秦野市ヤビツ峠,
19800923, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002000, 神奈川
県逗子市桜山, 20000404, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK
5002001, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010427, 鈴木
裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002002, 神奈川県横須賀市佐島町天
神島, 20020513, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002004, 神奈
川県葉山町三ヶ岡山, 20040614, 鈴木 裕 採集.

Pimpla luctuosa Smith, 1874 マイマイヒラタヒメバチ
1 F, KPM-NK 5002005, 神奈川県横須賀市砲台山, 19920517,
鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002011, 神奈川県葉山町仙元
山, 19960601, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002010, 神奈
川県横須賀市鷹取山, 19990614, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-
NK 5002006, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20010427, 鈴木 裕
採集; 1 M, KPM-NK 5002009, 神奈川県鎌倉市源氏山公園,
20010511, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002008, 神奈川県
横須賀市衣笠山公園, 20031002, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-
NK 5002007, 神奈川県 鎌倉市 山崎 中央公園, 20090427, 鈴
木 裕 採集.

Pimpla nipponica Uchida, 1928 チビキアシヒラタヒメバチ
1 M, KPM-NK 5001996, 神奈川県横須賀市津久井,
20040620, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001997, 神奈川県
横須賀市津久井 鬼ヶ谷戸, 20090927, 鈴木 裕 採集.

Pimpla pluto Ashmead, 1906 クロフシヒラタヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001998, 静岡県浜松市下石田, 19861130, 鈴

木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001999, 長野県小谷村千国乙,
20100715, 鈴木 裕 採集.

Scambus (Ateleophadnus) vulgaris Momoi, 1973
シンムシヤドリフシヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001984, 神奈川県横須賀市津久井, 20021118,
鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001985, 神奈川県鎌倉市山崎
中央公園, 20091021, 鈴木 裕 採集.

Sericopimpla erythromerus Momoi, 1977
ミノガヤドリヒラタヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001975, 神奈川県鎌倉市十二所, 20120610,
鈴木 裕 採集.

本種が含まれる *Sericopimpla* 属は大型のミノガの仲間に特
異的に寄生するが、これらミノガの減少に伴い、減少してい
る。上記標本は近年得られたものであり、貴重な記録である。

Tromatobia nipponica Uchida, 1928
ニッポンクモヤドリヒラタヒメバチ
1 M, KPM-NK 5001986, 神奈川県横須賀市追浜本町,
20060425, 鈴木 裕 採集.

Xanthopimpla clavata Krieger, 1914
ミノオキイロヒラタヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001995, 神奈川県横須賀市追浜本町,
20060404, 鈴木 裕 採集.

Zatypota albicoxa (Walker, 1874) マダラコブクモヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001990, 神奈川県横須賀市野比5丁目,
20131028, 鈴木 裕 採集.

Ephialtini spp.
1 M, KPM-NK 5001989, 神奈川県座間市入谷 谷戸山公園,
20010520, 山本光人 採集; 1 M, KPM-NK 5001988, 神奈川県
鎌倉市十二所, 20100409, 鈴木 裕 採集.

Poemeniinae クチキヒメバチ亜科

Cnastis vulgaris (Uchida, 1928) キスジククチキヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001956, 神奈川県横須賀市鷹取山, 20110506
鈴木 裕 採集.

Eugalta albimarginalis (Uchida, 1928)
シロスジククチキヒメバチ
1 F, KPM-NK 5001948, 神奈川県鎌倉市源氏山公園,
19940529, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001955, 神奈川
県横須賀市野比, 19970518, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK
5001953, 千葉県一宮町 軍茶利山, 19970714, 鈴木 裕 採集;
1 F, KPM-NK 5001950, 神奈川県葉山町南郷公園, 20000516,
鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001951, 神奈川県横須賀市佐
島の丘, 20010623, 鈴木 裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001949,
神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20010804, 鈴木 裕 採集;
1 F, KPM-NK 5001952, 神奈川県横須賀市佐島町天神島,
20020702, 鈴木 裕 採集; 1 M, KPM-NK 5001954, 神奈川県
葉山町長柄・大山, 20110505, 鈴木 裕 採集.

各地に多い普通種で、三浦半島においては枯れ木に集まる
寄生蜂の中では最も良く見られる種である。

Rhyssinae オナガバチ亜科

Megarhyssa praecellens (Tosquinet, 1889)

オオホンオナガバチ

1 F, KPM-NK 5001962, 山梨県韮崎市穂坂, 20070819, 鈴木裕 採集; 2 M, KPM-NK 5001963 ~ 5001964, 山梨県甲州市上萩原, 20130720, 鈴木裕 採集.

Megarhyssa sp.

1 F, KPM-NK 5001965, 神奈川県横須賀市貝山, 19800921, 鈴木裕 採集.

ミカドオナガバチと仮称されている未記載種である。

Rhyssella furanna (Matsumura, 1912) フランオナガバチ

1 M, KPM-NK 5001966, 山梨県甲州市上萩原, 20130720, 鈴木裕 採集.

Triancyra galloisi (Uchida, 1928) ガロアオナガバチ

1 M, KPM-NK 5001969, 神奈川県鎌倉市十二所, 20090515, 鈴木裕 採集.

Triancyra sp.

1 M, KPM-NK 5001968, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20000705, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001967, 神奈川県横須賀市猿島, 20020621, 鈴木裕 採集.

良く見られる種である。中国に近似の種がいるが、おそらくは未記載種。

Tersilochinae

Tersilochinae 未同定種

1 F, KPM-NK 5001938, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20021105, 鈴木裕 採集.

Tryphoninae ハバチヤドリヒメバチ亜科

Netelia spp.

1 M, KPM-NK 5002014, 神奈川県横須賀市大楠山, 19680907, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002015, 神奈川県横須賀市秋谷子安, 19951125, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002016, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010712, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002013, 長野県須坂市峰の原高原, 20070818, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002012, 長野県須坂市峰の原高原, 20070819, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002017, 神奈川県横須賀市野比5丁目, 20111025, 鈴木裕 採集.

Xoridinae マルズヒメバチ亜科

Ischnoceros sapporensis Uchida, 1928

サッポロマルズヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001961, 山梨県南都留郡三ツ峠山, 19970902, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001960, 神奈川県鎌倉市十二所, 20100708, 鈴木裕 採集.

Odontocolon sp.

1 F, KPM-NK 5001959, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20030731, 鈴木裕 採集

Xorides investigator (Smith, 1874) クロマルズヒメバチ

1 F, KPM-NK 5001958, 神奈川県鎌倉市源氏山公園,

20010511, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001957, 山梨県甲斐市茅ヶ岳, 20090817, 鈴木裕 採集.

Braconidae コマユバチ科

Aleiodes (Chelonorhogas) convexus van Achterberg, 1991

1 M, KPM-NK 5001729, 神奈川県逗子市池子, 20030705, 鈴木裕 採集;
神奈川県初記録である。

Aleiodes (Chelonorhogas) microculatus (Watanabe, 1937)

1 M, KPM-NK 5001731, 静岡県御殿場市大阪, 19900830, 鈴木裕 採集;

Aleiodes (Chelonorhogas) sapporensis (Watanabe, 1937)

サッポロクロカモドキバチ

1 F, KPM-NK 5001730, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20010506, 鈴木裕 採集;

Braunsia postfurcalis Watanabe, 1937

1 F, KPM-NK 5002113, 福島県楡枝岐村楡枝岐, 20010729, 鈴木裕 採集;

Braunsia matsumurai Watanabe, 1937

マツムラベッコウコマユバチ

1 F, KPM-NK 5002114, 神奈川県葉山町島山, 19641004, 鈴木裕 採集;

Cremnops desertor (Linnaeus, 1758) クロヒゲアカコマユバチ

1 M, KPM-NK 5002115, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20010820, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002116, 千葉県千葉市多部田町, 20010915, 鈴木裕 採集.

Macrocentrus sp.

1 ex., KPM-NK 5001738, 神奈川県横須賀市三峰山, 20020502, 鈴木裕 採集.

Phanerotoma (Phanerotoma) flava Ashmead, 1906

キイロコウラコマユバチ

1 ex., KPM-NK 5001728, 神奈川県横須賀市久里浜緑地, 20060702, 鈴木裕 採集.

Pseudoshirakia yokohamensis (Cameron, 1910)

ヨコハママダラコマユバチ

1 M, KPM-NK 5002110, 神奈川県逗子市披露山, 20010907, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002108, 神奈川県横須賀市佐島の丘, 20020702, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002109, 神奈川県横須賀市阿部倉, 20040814, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002111, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20060916, 鈴木裕 採集.

Snellenius theretrae (Watanabe, 1937) スズメヤドリコマユバチ

1 ex., KPM-NK 5001737, 神奈川県横須賀市馬堀自然教育園, 20010712, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001736, 神奈川県横須賀市秋谷子安, 20030430, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5001735, 神奈川県横須賀市貝山緑地, 20030619, 鈴木裕 採集.

Stantonia sp.

1 F, KPM-NK 5002117, 神奈川県葉山町長柄, 20030810, 鈴木裕 採集;

Zelex sp.

3 M, KPM-NK 5001732 ~ 5001734, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20030430, 鈴木裕 採集;

Zombrus bicolor (Enderlein, 1912) ムネアカトゲコマユバチ

1 M, KPM-NK 5002112, 神奈川県逗子市神武寺, 19850815, 鈴木裕 採集.

コマユバチ科の未同定種

1 ex., KPM-NK 5002119, 神奈川県横須賀市貝山, 19790712, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002118, 神奈川県逗子市神武寺, 19850916, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002120, 神奈川県横須賀市長井, 19940904, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002125, 神奈川県横須賀市野比, 19970518, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002126, 神奈川県三浦市城ヶ島, 19971206, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002121, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20000708, 鈴木裕 採集; 1 M, KPM-NK 5002124, 神奈川県横須賀市猿島, 20010513, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5001727, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20020423, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002122, 神奈川県横須賀市佐島町天神島, 20020905, 鈴木裕 採集; 1 ex., KPM-NK 5002123, 神奈川県横須賀市小原台, 20080428, 鈴木裕 採集.

Aulacidae セダカヤセバチ科

Pristaulacus insularis Konishi, 1990 クロシオセダカヤセバチ
1 F, KPM-NK 5002106, 神奈川県横須賀市衣笠山公園, 20060716, 鈴木裕 採集;

Pristaulacus intermedius Uchida, 1932 ホシセダカヤセバチ

1 F, KPM-NK 5002105, 山梨県甲州市上萩原, 20130721, 鈴木裕 採集;

Gasteruptidae コンボウヤセバチ科

Gasteruption assectator (Linnaeus, 1758)

ヒメコンボウヤセバチ

1 F, KPM-NK 5002104, 神奈川県鎌倉市源氏山公園, 20080522, 鈴木裕 採集;

Gasteruption japonicum Cameron, 1888

オオコンボウヤセバチ

1 F, KPM-NK 5002099, 神奈川県横須賀市追浜, 19880618, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002101, 神奈川県葉山町三が岡山, 19970905, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002098, 神奈川県横須賀市野比, 20030429, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002102, 神奈川県逗子市池子, 20030705, 鈴木裕 採集; 1 F, KPM-NK 5002103, 神奈川県葉山町長柄, 20030810, 鈴木裕

採集; 1 F, KPM-NK 5002100, 神奈川県横須賀市野比 5 丁目, 20100704, 鈴木裕 採集.

Trigonaliidae カギバラバチ科

Orthogonalys hageromonis Teranishi, 1929

ハゴロモカギバラバチ

1 M, KPM-NK 5002107, 神奈川県横須賀市鷹取町, 20020414, 鈴木裕 採集;

まとめ

筆者の一人、鈴木が生命の星・地球博物館に寄贈した、計 337 個体の寄生蜂について、同定と目録化を行った。ヒメバチ科 90 種、コマユバチ科 10 種、セダカヤセバチ科 2 種、コンボウヤセバチ科 2 種、カギバラバチ科 1 種について種名が判明した。このうち、ヒメバチ科のアミメコンボウアメバチ、ガルガワコンボウアメバチ、トサチビアメバチ、キマダラアシナガバチヤドリトガリヒメバチ、キマダラコシホソトガリヒメバチ、*Euceros pectinis*、イシヤマチビヒメバチ、コブフタオヒメバチ、クロホシアメバチ、コマユバチ科の *Aleiodes (Chelonorhogas) convexus* の計 10 種は、神奈川県新記録である。また、ヒメバチ科の *Coleocentrus exareolatus* と *Ichneumon kuroishiensis* は長野県初記録、沖縄本島で得られたマダラホソトガリヒメバチは南西諸島初記録である。

引用文献

- Ito, M. & K. Maeto, 2015a. Two species of the genus *Coleocentrus* (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae) new to Japan. *Japanese Journal of Systematic Entomology*, **21**(1): 87-89.
- Ito, M. & K. Maeto, 2015b. Revision of the genus *Jezarotes* Uchida (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae), with the description of a new species from Laos. *Zootaxa*, **3946**(3): 416-426.
- Momoi S (1963) New host records of Ichneumonidae of Japan and new homonymy. *Insecta matsumurana*, **26**: 54.
- 長瀬博彦, 2006. ハチ類. In: 高桑正敏・勝山輝男・木場英久 (編), 神奈川県レッドデータ生物調査報告書, pp. 431-435. 神奈川県立生命の星・地球博物館, 小田原.

(受付 2015 年 10 月 27 日; 受理 2015 年 12 月 3 日)