

三浦半島におけるハクビシンの交通事故死3例

池田等・山田和彦

Hitoshi Ikeda and Kazuhiko Yamada: Three Records of Traffic Accidental Death of Masked Palm Civet (*Paguma larvata*) in Miura Peninsula, Kanagawa Prefecture

はじめに

神奈川県内におけるハクビシン *Paguma larvata* (食肉目・ジャコウネコ科)の分布状況については、中村ほか(1989)、中村(1990)、中村・石原(1992)、中村ほか(1996)による報告がある。中村ほか(1996)によれば三浦半島での本種の分布記録は、1991年と1992年の横須賀市における2件だけであった。また、1995年までに三浦半島の付け根にあたる鎌倉市や横浜市栄区・金沢区で計4件の情報があつたが、三浦半島北部(逗子市・葉山町)における本種の生息に関する情報はなかった。

この度、筆者らは三浦半島の葉山町と三崎市で、交通事故死によるハクビシン3個体を確認したので報告する。この結果から本種は1991年以降、三浦半島広域に分布を広げ、現在では相当数が分布していると推定される。

最近では千葉県においても本種の分布が多数確認され(落合, 1998; 落合・浅田, 2002)、マスコミを通じ、関東地方各所に本種の出没が話題となっている中、今後のさらなる分布拡大、個体数増加による生態系あるいは農作物への影響が懸念される。

なお、神奈川県内の野生哺乳類の交通事故死については、足柄上郡山北町における山口(2001)の報告があり、ハクビシン10頭の事故例があつた(1997～1999年間)と記録されている。

おわりに、情報および写真を提供していただいた日高芳子氏に感謝申し上げる。

記 録

1. 2002年1月1日

三浦郡葉山町一色県道葉山しおさい公園前で交通事故死(池田等 確認), ♂ 頭胴長 33.5cm, 尾長 24.5cm, 体重 830g (図1, 図2-1)

2. 2002年3月24日

三浦市引橋県道で交通事故死(山田和彦 確認), ♀ 頭胴長 51.0cm, 尾長 37.0cm, 体重 3500g (図1, 図2-2)

3. 2002年5月20日

三浦市諸磯で交通事故死(日高芳子氏 確認), 全長約 70cm, 性別・体重不明 (図1, 図2-3)

文 献

- 中村一恵・石原龍雄・坂本堅五・山口佳秀, 1989. 神奈川県におけるハクビシンの生息状況と同種の日本における由来について. 神奈川自然誌資料, (10):11-41.
- 中村一恵, 1990. 神奈川県におけるハクビシンの生息状況(補遺). 神奈川自然誌資料, (11): 75-78.
- 中村一恵・石原龍雄, 1992. 神奈川県におけるハクビシンの生息状況(補遺2). 神奈川自然誌資料, (13): 1-6.
- 中村一恵, 1996. 神奈川県におけるハクビシンの生息状況(4). 神奈川県立自然保護センター報告, (13): 41-45.
- 落合啓二, 1998. 千葉県におけるハクビシンの分布と移入経路. 千葉中央博自然誌研究報告, 5(1): 51-54.
- 落合啓二・浅田正彦, 2002. ハクビシンの千葉市への移入. 千葉中央博自然誌研究報告, 7(1): 17-19.
- 山口喜盛, 2001. 山北町における野生哺乳類の交通事故死. 神奈川自然誌資料, (22): 25-28.




図1. ハクビシン交通事故死確認地点.



図 2-1. 三浦郡葉山町一色県道の交通事故死体（写真：池田 等）.



図 2-2. 三浦市引橋の交通事故死体（写真：池田 等）.



図 2-3. 三浦市諸磯の交通事故死体（写真：日高芳子）.

（池田：葉山しおさい博物館，山田：相模湾海洋生物研究会）